Actualité en TEP dans le diagnostic et le traitement des métastases osseuses

Oncomel
Séminaire de Médecine Générale
2 Juillet 2019

Mathilde Thélu-Vanysacker

Diagnostic de métastase d'emblée ou durant l'évolution

- Diagnostic de métastase d'emblée ou durant l'évolution

Médiane survie = 24 mois (jusqu'à 10 ans)

- Tournant avec traitement dans une intention palliative et non plus curative

Place de la TEP/TDM au FDG

- **diagnostic préthérapeutique ou de récurrence**
- **prédire et évaluer la réponse tumorale** pour plusieurs lésions et/ou organes (foie, squelette, ganglions) en fonction de la stratégie thérapeutique

- ✓ Guide Bon Usage des Examens d'Imagerie 2013
- ✓ Recommandations de bonne pratique clinique
pour l'utilisation de la tep en cancérologie
Label INCa-HAS SFMN version 09.05.2018

TEP-TDM

TEP : Tomographie par émission de positons = PET (Scan)

images du corps en coupes avec un traceur radioactif émetteur de positons

FUSION

Quantification: le SUV du FDG

Traceur actuel : le ^{18}F FDG

- 2-[^{18}F]fluoro-2-désoxy-D-glucose
- Vecteur: analogue du glucose
- Marqueur: fluor 18 (bêta⁺, T=110 min)

Hypermétabolisme:

- cancers
- pathologie inflammatoire
- pathologie infectieuse

TEP-FDG

A JEUN 6H

POIDS

Contre Indication : **grossesse**, allaitement

Causes de Faux Négatifs

- K prostate (temps de doublement long+++),
- Carcinome hépatocellulaire ,
- Bronchiolo-alvéolaire
TNE bien différenciées
- Formes mucineuses (pancréas, ovaire, colon)
Carcinome lobulaire infiltrant
- Carcinome rénal à cellules claires

Délai:

- **3 semaines après chimiothérapie**
- **3 mois après radiothérapie**
(phénomènes inflammatoires)

A jeun depuis au moins 6 heures
Glycémie <2g/L

Diabétique ?

Ce n'est pas une contre-indication.

Pour le diabète de type II:

les patients traités par anti-diabétiques oraux : à jeun 6H et prendre leurs médicaments

Arrêt à partir du jeûne des ADO insulino-sécréteurs et des insulines rapides et ultra-rapides.

Pour le diabète de type I et le diabète de type II insulino-requérant:

petit déjeuner léger 2H avant et s'injecter leur dose habituelle d'insuline

Irradiation pour 3 MBq/kg de masse corporelle

Dose efficace max 10 mSv

Cancer du sein

Bilan d'extension à distance (Inca 2012)

- Cancer du sein infiltrant, T3,T4 ou N+
- Avant chimiothérapie néo-adjuvante
- Cancer triple négatifs, HER2surexprimé ou amplifié, T2N- ou pN1mi

• TEP-TDM

ou

• TDM tap+ scintigraphie osseuse

Cancer du sein

Bilan d'extension initiale TEP-FDG

(SFMN 2018)

- **Recommandée pour les tumeurs mammaires cliniquement de stade $\geq$ IIB (T2N1- T3N0) de préférence avant chirurgie.**
- **Proposée pour le bilan d'extension des tumeurs mammaires cliniquement de stade IIA (T1N1 ou T2N0) de préférence avant chirurgie.**
- **Recommandée: en cas de métastase ganglionnaire axillaire prévalente (recherche d'autres foyers métastatiques) : N1 prévalent ou lors du diagnostic initial.**
- **La TEP au FDG n'est pas actuellement recommandée pour le bilan d'extension des tumeurs mammaires cliniquement de stade I (T1N0) (<2cm)**

Cancer du sein

Bilan d'extension initiale

Scintigraphie Osseuse

Indiquée dans certains cas particuliers mais peut être substituée par TEP au FDG.

- ✓ Cancer inflammatoire à haut risque métastatique osseux,
- ✓ Si signes d'appel osseux

La scintigraphie du squelette peut être complémentaire de l'examen TEP, surtout pour la détection des métastases ostéocondensantes.

Cancer du sein: Diagnostic d'une récurrence TEP FDG

La TEP au FDG est recommandée :

- En cas de **suspicion de récurrence**
- Pour la stadification d'une récurrence avérée

- *Risque élevé récurrence: jeune < 40 ans, triple négatif, HER2 positifs, atteinte ganglionnaire, maladie résiduelle après tt néoadjuvant*

Cancer du sein : Evaluation thérapeutique TEP-FDG

- La TEP-FDG peut-être proposé pour l'évaluation précoce de la réponse au traitement néoadjuvant, en particulier en cas de tumeur triple négative ou HER2+
- La TEP-FDG peut-être proposé pour l'évaluation des traitements systémiques en phase métastatiques (en particulier au niveau des métastases osseuses).

Cancer Prostate : bilan d'extension ganglionnaire et osseux

Comité de cancérologie de l'Association Française d'urologie 2018

- La TEP à la FCholine peut être proposée pour le bilan d'extension initial des patients à haut risque métastatique de d'Amico: PSA>20 ng/ml ou score Gleason>7 ou stade clinique pT2c et en intention de traitement curatif.
- La scintigraphie osseuse est recommandée :patients risque intermédiaire d'Amico (grade 4 majoritaire): stade T2b ou PSA : 10-20ng/ml ou Gleason: 7
- La TEP à la FCholine peut être proposée pour orienter des biopsies chez des patients suspects de cancer de prostate ayant des biopsies itératives négatives.

Cancer de Prostate: diagnostic de la récidive

- La TEP à la FCholine est recommandée pour l'exploration des récidives biologiques plus particulièrement si le taux de PSA ≥ 2 ng/mL.
- Pour des taux de PSA ≤ 2 ng/mL, la cinétique rapide du PSA avec un temps de doublement ≤ 6 mois, permet de sélectionner les patients à haute probabilité de TEP à la FCholine contributive.
- La TEP aux analogues du PSMA peut être proposée pour l'exploration des récidives biologiques, lorsque le bilan d'imagerie est non contributif.

Cancer de prostate: TEP- PSMA Gallium68

- **Antigène de surface exprimé par la quasi- totalité des cellules de cancer de la prostate**
- **Disponibilité dans certain centre par ATU nominative**
- Meilleure détection de la tumeur primitive et des petites métastases ganglionnaire qu'avec la fluorocholeine
- Approche théranostique pour la radiothérapie métabolique par ligand du PSMA
- Mais nécessité d'un générateur de gallium et d'un marquage sur site

Cancer du Poumon: TEP FDG suspicion clinique

- La TEP au FDG est recommandée pour caractériser un nodule pulmonaire solide de taille supérieure ou égale à **8 mm**.
- Si mixte > 15 mm
(ou > 8 mm après contrôle TDM à M3)
- Sensibilité 95% Spécificité 82%
GUIDELINES Chest 201

Cancer bronchopulmonaire

bilan d'extension initiale TEP FDG

- La TEP au FDG **est recommandée pour le bilan d'extension des CBNPC** en l'absence de localisation à distance avérée.
- La TEP au FDG **peut être proposée pour le bilan d'extension des CPPC.**
- La TEP au FDG peut être proposée pour mieux caractériser le volume tumoral à irradier (notamment en présence d'atélectasie).
- La TEP au FDG peut être proposée pour évaluer la réponse tumorale aux traitements systémiques.
- La TEP au FDG **est recommandée en cas de suspicion de récurrence des cancers bronchopulmonaires.**
- La TEP au FDG peut être proposée pour le diagnostic différentiel entre récurrence ou maladie résiduelle et fibrose post-radique.
- La TEP au FDG peut être proposée pour caractériser les lésions pleurales.

Cancer Ovaire

- La TEP au FDG est recommandée en cas de **suspicion de récurrence** du cancer de l'ovaire en particulier par l'élévation de la concentration sérique du CA125.
- La TEP au FDG peut être proposée **pour le bilan d'extension du cancer de l'ovaire avancé** ($\geq$ Stade FIGO III).
- La TEP au FDG peut être proposée pour le bilan d'extension de la récurrence du cancer de l'ovaire.

Cancer endomètre et col utérin

- La TEP au FDG peut être proposée dans le **bilan d'extension** du cancer de l'endomètre en cas de risque élevé de cancer métastatique $\geq$ **Stade FIGO II**.
- La TEP au FDG peut être proposée en cas de suspicion de **récidive** du cancer de l'endomètre.
- La TEP au FDG est **recommandée pour le bilan d'extension initial dans les cancers du col utérin $\geq$ stade FIGO IB2**.
- La TEP au FDG peut être proposée en cas de **récidive avérée** du cancer du col utérin, notamment pour décider de la stratégie thérapeutique.

Cancer de Vessie:

- La TEP au FDG peut être proposée pour le bilan de l'extension extravésicale des tumeurs vésicales infiltrant le muscle avant cystectomie.
- Suivi: La TEP au FDG en cas de suspicion de récurrence.

Mélanome

- La TEP au FDG est recommandée dans le bilan d'extension du mélanome cutané avec localisation ganglionnaire macroscopique connue ou à risque métastatique à distance élevé (stade IIIB-C).
- La TEP au FDG est recommandée dans le bilan pré-thérapeutique chez les patients en stade IV connu.
- La TEP au FDG est recommandée dans le bilan d'extension du mélanome cutané en récurrence ganglionnaire ou à distance.
- La TEP au FDG est recommandée dans le bilan pré-opératoire du mélanome cutané stade IV en cas de localisation métastatique présumée isolée.
- La TEP au FDG peut être proposée dans le suivi en cas de point clinique d'appel ou en cas de mélanomes à haut risque de métastases à distance et de stades IIIB-C.

Myélome

- La TEP au FDG est recommandée au bilan initial du myélome multiple symptomatique. La TEP au FDG est recommandée au bilan initial des plasmocytomes.
- La TEP au FDG peut être proposée en cas de suspicion d'évolution d'un myélome multiple asymptomatique.

Cancer Colo-rectaux

- La TEP au FDG est recommandée dans le **bilan pré-thérapeutique** des cancers colorectaux s'il existe des anomalies suspectes de métastases.
- La TEP au FDG est recommandée dans le contexte de **métastases connues et résécables**, afin de s'assurer de l'absence d'autres sites métastatiques.
- La TEP au FDG est recommandée en cas de suspicion de récurrence en particulier en **cas d'ascension isolée de l'ACE** chez un patient déjà opéré d'un cancer colorectal.
- La TEP au FDG est recommandée dans le **bilan pré-opératoire des récurrences** locales et métastatiques des cancers colorectaux.
- La TEP au FDG peut être proposée pour **la détection de récurrence après traitement local des métastases hépatiques**.
- La TEP au FDG peut être proposée à **la fin du traitement** de radiochimiothérapie du cancer du rectum pour évaluer la réponse au traitement.
- La TEP au FDG est recommandée pour **la stadification initiale du cancer du canal anal, pour les tumeurs T2-T4N0 et pour toutes les tumeurs N+**.
- La TEP au FDG peut être proposée pour l'évaluation thérapeutique à la fin du traitement de radiochimiothérapie dans le cancer du canal anal.